

## عوامل مؤثر بر ترکیب میکروفلور روده

دستگاه گوارش جوجه های تازه از تخم خارج شده تقریباً استریل است .

در ۳ روزگی تعداد قابل توجهی میکروب در روده شکل گرفته است .  
در ۱۴ روزگی ترکیب میکروفلور روده کامل شده است .

استرس باعث بر هم خوردن تعادل میکربی دستگاه گوارش می شود

### میکروفلور روده شامل:

■ میکربهای مفید که به هضم و جذب غذا کمک میکنند

■ میکربهای فرصت طلب

در شرایط طبیعی میکربهای مفید غالب هستند و بین آنها و میکربهای فرصت طلب تعادل برقرار است

## ➤ عواملی که باعث بهم خوردن تعادل میکربی دستگاه گوارش میشوند

- استرس جابجائی

- تماس جوجه ها با عوامل بیماریزای محیط

- بلع میکربهائی که به همراه آب و دان به دستگاه گوارش میرسند

## ➤ جهت پیشگیری از تاثیر منفی این عوامل

- رعایت ضوابط بهداشتی هنگام حمل و نقل جوجه

- رعایت ضوابط بهداشتی در فارم

- مصرف آنتی بیوتیک مناسب با توجه به وضعیت گله مادر و آلودگیهای محیط