

مدیریت تخم مرغهای بستری دوره پرورش

نشستن در جای امن پرندگان را به پریدن و فروآمدن درجای امن تشویق کنید .

فرم هایی به شکل A باید در پایین تر از مرکز سالن قراردادده شود . به ازای هر ۱۰۰۰-۵۰۰ قطعه پرنده یک فریم منظور گردد . تعبیه فریها هر چه زودتر (۲-۳ هفتگی) باید صورت گیرد . بهره گیری از فرم ها از سن ۲ هفتگی جهت خروس ها مفید می باشد . استفاده از نور Slux ممکن است باعث تنبلی طیور گردد . طیور ممکن است این خصوصیت را در طول دوران زندگی خود حفظ نمایند که منجر به عدم رغبت طیور به تخمگذاری در تله در تله های تخمی گردد .

دوره تولید

تله ها (تله های مکانیکی)

- تا زمان نشانه گذاری ، تله تخمی ها را باز نکنید .
- به منظور ایجاد فرصت برای مرغها که بتوانند کامل داخل لانه را ببینند بین هر دوتله تخمی بایستی یک دیواره حایل قرار گیرد که این امر باید بعد از نشانه گذاری صورت گیرد .
- آبخوریها را زیاد نزدیک به تله تخمی قرار ندهید زیرا بصورت مانع عمل خواهد کرد .
- برای هر ۵ مرغ یک تله در نظر گرفته نشود .
- تله ها (دستی / جمع آوری دستی)
- روشنایی (لامپ) باید در فاصله بین تله تخمی قرارگیرد .
- تله تخمی باید در ابتدا مستقیماً در کف سالن قرار گیرد بطوریکه فضای خالی درزیر تله های تخمی وجود نداشته باشد که طیور برای تخمگذاری از آن استفاده کنند .
- تله تخمی بعد از اولین تخمگذاری به تدریج باید از زمین فاصله بگیرد .
- در ۱۰ درصد تولید ۱/۳ تله باید برده شود . (روی پایه ها قراردادده شوند) .
- در ۳۰ درصد تولید ۱/۲ تله بالابرده شود .
- در ۵۰ درصد تولید همه تله ها بالا برده شود .

از قراردادن کف متحرك تله ها و ریختن پوشال چوب تا نشانه گذاری خودداری کنید .

تخم مرغهاي اوليه داخل تله تخمي هاي ديگر مستقل كنيد . اينكار باعث تشويق طيور به تخمگذاري در تله ميگردد .
تخم مرغهاي بستري را درتله ها قرار ندهيم .
ناحيه زير تله ها را بسته نگه داريد تا تخم مرغهاي بستري به حداقل برسد .

به ازاي هر ۴/۵ - ۴ مرغ يك تله تخمي منظور نماييد .

بطوركلي

درصد خروس به مرغ بايد با توصيه هاي كاب هماهنگ باشد .
افزايش بيش از حد خروس باعث ايجاد استرس در مرغها شده و شانس توليد تخم مرغ بستري را افزايش ميدهد .

توزيع وسايل در سالن

تا آنجا كه ممكن است توزيع وسايل در سالن بايد منطقي باشد .
داخوريهاي خروسها بايد به ديوار نزديك باشد سپس داخوري مرغها و سپس اجوريها و بعد تله ها . هرگز داخوري خروسها را نزديك تله قرار ندهيد .

ارتفاع داخوري و آخوري

از ارتفاع مناسب داخوري و آخوري مطمئن باشيد . عدم انجام اين كار ممكن است بعنوان يك سدفيزيكي عمل كند در دسترس به تله ها را محدود ميكند و در پي آن تعداد تخم مرغهاي بستري افزايش مي يابد .

جمع آوري تخم مرغهاي بستري

افزايش تعداد دفعات جمع آوري تخم مرغهاي بستري در هفته هاي اوليه توليد (۲۵ تا ۳۰ هفتگي) (حداقل ۸ بار در روز) در کاهش تخم مرغهاي بستري موثر خواهد بود .

سبز دشت